



ROEDORES

RATA DE TEJADO

Rattus rattus



El pelaje es largo, duro y bastante ralo.
Las orejas son medianas, peladas.
La cola larga, pelada y escamosa; es mas larga que el tamaño del cuerpo más la cabeza.
Los bigotes son largos y le llegan hasta los hombros.

Son comensales del hombre y pueden transmitirle muchas enfermedades como: leptospirosis, peste, salmonelosis, tifus murino, toxoplasmosis, leishmaniasis, mal de Chagas, encefalitis equina, esquistosomiasis, etc.

- Son seriamente destructivos royendo paredes, pisos y techos; dañan sistemas al cortar cables eléctricos, tuberías, sistemas de computación, provocar incendios e inundaciones, etc.
- Destruyen y contaminan alimentos.

- Es muy prolífica, con una gestación de 21 a 29 días.
- Tienen hábitos nocturnos, tienen bien desarrollado los sentidos del olfato, oído y tacto.
- Las hembras pueden parir 6 a 12, promedio de 8; por año procrea 5 camadas.
- Se reproducen durante todo el año. Alcanzan la madurez sexual a los 3 a 5 meses.
- Son muy buenas escaladoras.



RATA DE ALCANTARILLA

Rattus norvegicus

La cola es larga, casi sin pelo, recubierta por unas escamas finas que forman unos anillos, mide menos que la longitud de la cabeza y el cuerpo juntos. Las patas delanteras poseen 4 dedos más el pulgar casi atrofiado, y las traseras 5 dedos.



Son destructivos, contaminan alimentos, rollen diferentes materiales, dañan sistemas eléctricos, alcantarillado, etc. Habitan edificios, alcantarillas, graneros, granjas, basureros, setos cercanos a cultivos, etc.



Esta especie no tiene ningún problema de supervivencia.

Son comensales del hombre y pueden transmitirle muchas enfermedades como: leptospirosis, peste, salmonelosis, tifus murino, toxoplasmosis, leishmaniasis, mal de Chagas, encefalitis equina, esquistosomiasis, etc.



Es muy prolífica, con una gestación de 20 a 24 días.



Tienen hábitos nocturnos, tienen bien desarrollado los sentidos del olfato, oído y tacto.



Las hembras pueden parir 1 a 16, promedio de 7 a 8; por año procrea 5 a 6 camadas.



Se reproducen durante todo el año. Alcanzan la madurez sexual a las 11 semanas de edad.



Son muy buenas nadadoras.


RATÓN COMÚN

Mus musculus

Tiene una longitud que varía entre 7,5 – 10 cm (desde el hocico hasta la base de la cola); la cola es larga y peluda , que representa la mitad de su longitud.

Los bigotes son muy largos, hocico puntiagudo, orejas grandes redondeadas.

➤ Se ha adaptado muy bien a una existencia comensal y comúnmente invade la vivienda y los depósitos de alimentos humanos. Son seriamente destructivos, se encuentran atraídos por depósitos de alimentos, tiendas de comestibles, panaderías, molinos graneros, casas.



El ratón doméstico es un roedor que constituye una plaga sinantrópica. Causa graves pérdidas económicas. Es de importancia para la salud pública, porque están relacionados con muchas enfermedades como salmonelosis, coriomeningitis linfocítica, parásitos intestinales, etc.

- Es muy prolífica, con una gestación de 19 a 20 días.
- Tienen hábitos nocturnos, tienen bien desarrollado los sentidos del olfato, oído y tacto.
- Las hembras pueden parir 10, promedio de 60 por año.
- Se reproducen durante todo el año. Alcanzan la madurez sexual a los 2 meses.